

## HET COLLEGE VOOR DE TOELATING VAN GEWASBESCHERMINGSMIDDELEN EN BIOCIDEN

6 maart 2015

Actueel WG van het middel MYCOTAL, 10980 N

### Wettelijk Gebruiksvoorschrift

Toegestaan is uitsluitend het professionele gebruik als insectenbestrijdingsmiddel door middel van een gewasbehandeling in de volgende toepassingsgebieden (volgens Definitielijst toepassingsgebieden versie 2.0, Ctgb juni 2011) onder de vermelde toepassingsvoorwaarden

Toepassingsgebied	Te bestrijden organisme	Dosering (middel) per toepassing	Maximale dosering (middel) per toepassing	Maximaal aantal toepassingen per teeltcyclus of 12 maanden	Minimum interval tussen toepassingen in dagen	Veiligheids termijn in dagen
Aardbei (bedekte teelt)	Wittevlieg <sup>1</sup>	0,1% (100 gram middel per 100 liter water)	1 kg/ha	12 per teeltcyclus	7	1
Vruchtgroenten van <i>Cucurbitaceae</i> met eetbare schil (bedekte teelt)	Wittevlieg <sup>1</sup>	0,1% (100 gram middel per 100 liter water)	2 kg/ha	12 per teeltcyclus	7	1
Meloen	Wittevlieg <sup>1</sup>	0,1% (100 gram middel per 100 liter water)	2 kg/ha	12 per teeltcyclus	7	1
Vruchtgroenten van <i>Solanaceae</i> (bedekte teelt)	Wittevlieg <sup>1</sup>	0,1% (100 gram middel per 100 liter water)	2 kg/ha	12 per teeltcyclus	7	1
Bloemisterijgewassen m.u.v. snijroos (bedekte teelt)	Wittevlieg <sup>1</sup>	0,1% (100 gram middel per 100 liter water)	2 kg/ha	24 per 12 maanden	7	-
Snijroos (bedekte teelt)	Wittevlieg <sup>1</sup>	0,1% (100 gram middel per 100 liter water)	3 kg/ha	24 per 12 maanden	7	-
Boomkwekerijgewassen (bedekte teelt)	Wittevlieg <sup>1</sup>	0,1% (100 gram middel per 100 liter water)	2 kg/ha	24 per 12 maanden	7	-

<sup>1</sup>wittevlieg (*Bemisia tabaci*; *Trialeurodes vaporariorum*)

Het gebruik in de bedekte teelt van boon met peul is beoordeeld conform artikel 51 EG 1107/2009. Er is voor deze toepassing/toepassingen geen werkzaamheids- en fytotoxiciteitonderzoek uitgevoerd. Er wordt daarom aangeraden een proefbespuiting uit te voeren, voordat het middel gebruikt wordt. Gebruik van dit middel in dit/deze toepassingsgebied(en), komt voor risico en verantwoordelijkheid van de gebruiker.

Toepassingsgebied	Te bestrijden organisme	Dosering (middel) per toepassing	Maximale dosering (middel) per toepassing	Maximaal aantal behandelings-ingen per teeltcyclus	Minimum interval tussen toepassingen in dagen	Veiligheids-termijn in dagen
Boon met peul (bedekte teelt)	Wittevlieg <sup>1</sup> , trips <sup>2</sup>	0,1% (100 gram middel per 100 liter water)	1 kg/ha	12	7	1

<sup>1</sup>wittevlieg (*Bemisia tabaci*; *Trialeurodes vaporariorum*)

<sup>2</sup>trips (*Frankliniella occidentalis*; *Thrips tabaci*)

### Toepassingsvoorwaarden

In de bedekte teelt van aardbei dient MYCOTAL toegepast te worden met een spuitvolume van 1000 l water per ha.

In de bedekte teelt van vruchtgroenten van *Cucurbitaceae* met eetbare schil, meloen en vruchtgroenten van *Solanaceae* en van bloemisterij- en boomkwekerijgewassen dient MYCOTAL toegepast te worden met een spuitvolume van minimaal 1000 l water per ha.

In de bedekte teelt van snijroos dient MYCOTAL toegepast te worden met een spuitvolume van minimaal 2000 l water per ha.

In de bedekte teelt van boon met peul dient MYCOTAL toegepast te worden met een spuitvolume van 1000 l water per ha.

Micro-organismen kunnen mogelijk sensibiliserende reacties veroorzaken.

Wanneer men nog geen ervaring heeft met het gebruik van MYCOTAL in een bepaald gewas, wordt aangeraden eerst een klein gedeelte van dit gewas te behandelen voordat een toepassing op grote schaal plaatsvindt.